

Smatram da je mali broj bolesnika (ukupno 11) praćeno dovoljno dugo, kroz dvije godine. Prihvatljivo bi bilo pratiti i analizirati grupu od 30 bolesnika. Nije primjereno uspoređivati heterogene (po broju ispitanika te duljini uzimanja lijeka – od 24,18,12 i 6 mjeseci) grupe ispitanika. Iz studije nije vidljivo kada se dogodio relaps bolesti u skupini bolesnika koja je praćena 2 godine. Nije vidljivo koliko je bolesnika bilo muškog a koliko ženskog spola, a znamo da je MS bolest češća u žena. Isto tako nije postojala kontrolna skupina bolesnika (adekvatna po dobi, spolu i duljini trajanja bolesti te EDSS skor) kako bi se doista ustanovila efikasnost primjene interferona beta u navedenih bolesnika u odnosu na eventualno grupu tretiranu drugim lijekovima. Osim toga uobičajeno praćenje djelotvornosti primjene interferonske terapije u bolesnika s MS je analiza broja demijelinizacijskih lezija na MR snimkama mozga i leđne moždine što je također izostalo. Stoga je uputno studiju produžiti i proširiti u navedenom smislu te je potom eventualno objaviti u obliku stručnog članka.